


☆お茶の時間がありますので、
水筒をお持ちください。



★みんななかよし★



★「子育てひろば」や「なかよしひろば」では、
生後1か月を過ぎたお子様を参加対象としています。★
〈参加費は無料です〉

「七夕飾りを作ろう！」

7月6日(火)

時間) 10:00~11:30

場所) ひれふりランド1階・和室

7月7日は七夕。彦星様と織姫様が一年
に一度だけ会うことができると言われて
います。

親子で短冊に願い事を書いたり、簡単な
飾りを作り、夜空に飾りましょう。



「ままごとあそびをしよう」


7月13日(火)

時間) 10:00~11:30

場所) 浜玉町農村環境改善センター
(浜玉町五反田唐津市立玉島小学校の隣)

鍋や皿、食べ物などのままごとセットを
使ってごっこあそびを楽しみましょう。

お子様とままごとであそびながら、会話を
楽しんでみませんか？



「でんでん太鼓を作ろう」

7月20日(火)

時間) 10:00~11:30

場所) ひれふりランド1階・和室

アルミホイルの音を楽しみながら
でんでん太鼓を作ります。

ポコッ♪ポコッ♪と音を鳴らして
お子様と楽しんでみませんか？



「コナシオペイントでお絵描き」

7月27日(火)

時間) 10:00~11:30

場所) 浜玉町農村環境改善センター
(浜玉町五反田唐津市立玉島小学校の隣)

小麦粉と塩を使ってお絵描きをしま
しょう。

“ぷっくり”とした出来上がりが、
とてもかわいいですよ。



8月の
子育てひろばの予定

- ・3日(火)「スキンシップあそび」
- ・10日(火)「くつつく魚を作ろう」
- ・17日(火)「新聞紙をビリビリ」
- ・24日(火)「風鈴♪チリーン」
を予定しています。

◎はなまる連絡帳

<http://h-futaba.renrak.mobi/>

◎双葉保育園のさまざまな情報は
ホームページをご覧ください。

<http://www.futabahoiKuen.jp/>



携帯用 QR コード



●なかよしひろば●

☆新型コロナウイルス感染症の感染防止の為、自粛させていただいております。

※7月からの水あそび・プールあそびは、行いません。ご了承ください。

●園庭開放●

☆月～金曜日 11時30分～13時まで行っています。

あそびに来られる際は、体温の計測(親子共)と、保護者の方はマスクの着用をお願いします。



●子育て相談●

☆月～金曜日の9時～17時、土曜日の9時～14時まで開設しています。3密を避ける為、電話での御相談のみ受け付けております。御了承ください。

夏の感染症と皮膚トラブル

【手足口病】

症状：手のひら・足や足の裏・肘・膝の周りや臀部に赤く細かい発疹や口の中・舌・のどの周囲に水泡ができます。痛みで水分や食事がとれなくなることもあります。ウイルスの種類によっては無菌性髄膜炎などの合併症を起こすこともある為、注意が必要です。

家庭では：脱水を起こさないように水分補給を心がけます。口の中を痛がる時は、刺激が少ない口当たりの良いものを与えます。発熱もなく食欲もあれば登園も差し支えありません。大人にも感染するので注意しましょう。

【咽頭結膜熱(プール熱)】

症状：急な高熱(38～40℃)が出て、のどの痛みやだるさがあります。目が真っ赤に充血し、首のリンパ節が腫れます。のどの奥が赤くなり白っぽい分泌物が出ます。熱は3～4日続き、全身症状がよくなるまで1週間程度かかります。

家庭では：安静にし、高熱やのどの痛みによる脱水に注意します。食事はのどごしが良く、やや冷たいもの(ゼリーなど)を与えます。主な症状(熱・目の充血・のどの痛み)がなくなった後、2日を経過するまで登園できません。

【ヘルパンギーナ】

症状：急な高熱(38～40℃)が出て、2～3日続きます。のどの痛み・よだれが増える・食欲の低下・不機嫌などの症状が見られます。鼻水・くしゃみ・咳などはほとんどありません。

家庭では：のどの痛みをうまく伝えられない乳幼児では、よだれが多いことも特徴の一つです。のどの痛みにより固形物を嫌がる時は、のどごしのよい食べ物や飲み物を与えます。熱が下がり飲食が十分にできるようになるまで、登園しません。

【流行性角結膜炎(はやり目)】

症状：1～2週間の潜伏期間後、急に発症します。結膜の充血・かゆみ・ゴロゴロした異物感・まぶたの腫れ・粘り気のある目やになどの症状が見られます。

家庭では：感染力が強い目目の充血や目やになどの症状がなくなり、感染の恐れがないと医師に認められるまでは登園できません。家庭内での感染が広がらないように手洗いを心がけ、タオルは共有せず、ドアノブや蛇口などの消毒を行います。

【伝染性軟属腫(水いぼ)】

症状：白色で水っぽい光沢のある1～5mm大の半球状の腫瘍で、表面は平たく中央に凹みがあるいぼが体にできます。数カ月から2年程度で自然に消失すると言われています。

家庭では：こするとうつる為、わきの下や腕などでは広がりやすいので注意しましょう。また、タオルなどを介してうつるため、共有はしないようにしましょう。



【伝染性膿痂疹(とびひ)】

症状：虫刺されやあせも・すり傷などに黄色ブドウ球菌などが入り込み、水ぶくれができます。水ぶくれが破れ、それをかいた手で他の皮膚に触れると広がります。

家庭では：浸出液が多い時や患部が広範囲な時は1～2週間、登園を控えます。患部を覆うことができれば登園も可能です。患部は石けんとシャワーで洗い流して清潔にしましょう。抗菌薬を含んだ軟膏を塗ります。

【あせも】

症状：背中や肘の内側、首などに白や赤色の発疹が広がります。白く小さいものは1～2日で治りますが、赤いものは皮膚の炎症があり、かゆみを伴います。

家庭では：汗をかいたらシャワーで流したり、こまめにタオルで拭いたりしましょう。また、あせもをかきこわさないように爪は短く切りましょう。

【虫刺され】

症状：蚊やブユなどに刺されると大きく赤く腫れることがあります。かきこわさないようにしましょう。

家庭では：患部を石けんでよく洗い、市販の虫刺されやかゆみ止めの薬などをつけます。患部を冷やすとかゆみが和らぎます。

